

AFNEMEN VAN MRSA- KWEKEN BIJ MEDEWERKER

Wanneer kweken afnemen bij medewerker

Er zijn een aantal momenten waarop een medewerker moet controleren of hij/zij drager is (geworden) van MRSA. Overleg altijd met je leidinggevende over het al dan niet afnemen van kweken. Je leidinggevende moet hiervoor opdracht geven.

De momenten waarop je MRSA-kweken afneemt bij jezelf als medewerker zijn momenten na onbeschermd zorgcontact met de MRSA-positieve cliënt. Ter verduidelijking hierbij de definities van zorgcontact en onbeschermd contact

Zorgcontact is lichamelijk contact tijdens zorghandelingen zoals

- uitkleden cliënt
- wassen/douchen cliënt
- ondersteunen bij toiletgang wanneer cliënt niet/onvoldoende mobiel is

Alleen een hand geven of de rolstoel duwen of helpen met eten vallen NIET onder zorgcontact. Dus wanneer de medewerker alleen gewoon omgangscontact heeft gehad met de cliënt zoals we dat ook met andere mensen hebben worden er geen kweken afgenomen. (MRSA wordt met name overgedragen door intensief contact. Eerst wordt gekeken of de mensen met intensief contact MRSA hebben opgepikt. Wanneer dat zo is, wordt er weer verder gekeken naar medewerkers met minder intensief/risicovol contact.)

Onbeschermd contact is zorgcontact waarbij onvoldoende of geen handschoenen, schort met lange mouwen en/of een chirurgisch mondneusmasker gedragen is. Dus als 1 of meer van deze beschermende materialen niet gebruikt is tijdens het contact spreken we van onbeschermd contact

De momenten waarop MRSA-kweken bij de medewerker afgenomen moeten worden zijn:









- als de medewerker onbeschermd zorgcontact heeft gehad met een MRSA-positieve cliënt.
- als de medewerker de kamer van de cliënt heeft schoongemaakt en/of het bed heeft verschoond.
- als de medewerker uitgebreid lichamelijke therapie (bijvoorbeeld fysio) heeft gegeven aan de cliënt.
- als de medewerker in de afgelopen 2 maanden gedurende langer dan 24 uur in een buitenlandse zorginstelling opgenomen is geweest
- als de medewerker in de afgelopen twee maanden onbeschermd contact heeft gehad met een MRSA-positief persoon buiten de organisatie zoals partner of familie.

Route van aanvragen van kweken:

1. Neem contact op met de deskundige infectie preventie (info@careb4.nl/06-42274225). Doorgaans is dit de leidinggevende van de locatie.
2. De deskundige infectie preventie regelt dat de juiste kweken komen inclusief de labformulieren (gaat via Ziekenhuis Ter Gooi).
3. Deskundige infectie wordt door het laboratorium gebeld bij positieve uitslagen.
4. Deskundige infectie spreekt vervolg af bij positieve uitslagen.
5. De Bedrijfsarts krijgt bericht bij een positieve uitslag neemt dit op in het dossier van de medewerker.


Kweken afnemen; welke, waar, hoe en bewaren

Bij medewerkers worden alleen een keel en een neuskweek afgenomen. Bij medewerkers met chronische huidafwijkingen zoals eczeem en psoriasis wordt ook een uitstrijk van dit gebied afgenomen.

Welke kweken	Kweekmateriaal	Waar precies	Hoe	Bewaren
Neuskweek	E-Swab met rode dop 		Draai de E-swab een aantal maal door het voorste gedeelte van beide neusgaten (het neuspeutergebied)	Na afname max 24 uur in koelkast 2-8°C
Keelkweek	E-Swab met rode dop 		Met 1 E-swab achter in de keel net boven de huid beide tonsillen of tonsilbogen	Na afname max 24 uur in koelkast 2-8°C
Rectumkweek, alleen op indicatie	E-Swab met rode dop 		Strijk het gebied tussen de anus en de geslachtsorganen uit	Na afname max 24 uur in koelkast 2-8°C
Chronische huidlasies zoals bij eczeem en psoriasis indien aanwezig	E-Swab met rode dop 		Strijk met de E-swab de rand van het wondgebied uit	Na afname max 24 uur in koelkast 2-8°C

Gebruik van de E-swab

Neem kweek af



Haal swab uit de verpakking

Pak swab vast boven het gekleurde breekpunt

Open de buis en doe de swab erin, houd de vloeistof in de buis

Breek de swab af op het gekleurde breekpunt

Gooi reststukje weg en schroef dop op de buis, goed dichtdraaien!

Vul sticker in en plak deze op het buisje

Invullen labformulier

Vul de gegevens in **alle** geel gearceerde ruimten in

Vul als aanvrager "Bedrijfsarts" in (@Arbo / Brigitte Vroom Bedrijfsarts, Henk Schijvenaarsstraat 1 2031 VZ Haarlem, 088-2827260/ 06-42481596)


Vul bij MRSA PCR de kweken in die je hebt afgenomen. Je hoeft maar 1 formulier per medewerker in te vullen. Bij **medewerkers** worden alleen **een keel en een neuskweek** afgenomen. Bij medewerkers met **chronische huidafwijkingen** zoals eczeem en psoriasis wordt ook een uitstrijk van dit gebied afgenomen.

AANVRAAGFORMULIER MICROBIOLOGISCH ONDERZOEK EERSTE LIJN	
CENTRAAL BACTERIOLOGISCH EN SEROLOGISCH LABORATORIUM www.cbsl.nl	
Artsen-microbioloog: Dr. L. J. Bakker, Dr. J.W. Dorigo-Zetsma, Drs. I. Lede en Dr. E.A Reuland	
ARTS/ INZENDER	
Naam :	[Geel veld]
Adres :	[Geel veld]
Postcode + Woonplaats :	[Geel veld]
Telefoon :	[Geel veld]
Datum afname:	[Geel veld]
Klinische gegevens:	[Geel veld]
Verblijf buitenland:	[Geel veld]
Naam patiënt : [Geel veld]	
Geboortedatum : [Geel veld]	
PID nr. (evt) :	
Voorletter (s) : [Geel veld] M/V : [Geel veld]	
Adres : [Geel veld]	
Postcode : [Geel veld]	
Woonplaats : [Geel veld]	
BSN : [Geel veld]	
Eerste ziekte dag: [Geel veld]	
Verblijf buitenlands ziekenhuis: [Geel veld]	
MATERIAAL	
<input type="checkbox"/> Serum (stolbuis)	
<input type="checkbox"/> Urine	
<input type="checkbox"/> Catheter (eenmalig) <input type="checkbox"/> Verblifscatheter	
<input type="checkbox"/> Sperma	
<input type="checkbox"/> Feces	
<input type="checkbox"/> Sputum	
<input type="checkbox"/> Genitaaluitstrijk	
<input type="checkbox"/> Wonduitstrijk Herkomst: _____	
<input type="checkbox"/> Huiduitstrijk Herkomst: _____	
<input type="checkbox"/> KNO uitstrijk	
<input type="checkbox"/> Keel <input type="checkbox"/> Neus <input type="checkbox"/> Oor	
<input type="checkbox"/> Nagel Herkomst: _____	
<input type="checkbox"/> Huidschilfers Herkomst: _____	
<input type="checkbox"/> Anders: _____	
UROGENITAAL	
<input type="checkbox"/> Banale kweek	
<input type="checkbox"/> Gistkweek	
<input type="checkbox"/> Chlamydia/ Gonococcon PCR (eSwab, urine alleen man)	
<input type="checkbox"/> Trichomonas vaginalis PCR (eSwab)	
<input type="checkbox"/> Bacteriele vaginose PCR (eSwab)	
<input type="checkbox"/> Mycoplasma genitalium (eSwab)	
<input type="checkbox"/> Gonococcon kweek (eSwab bij kamertemperatuur)	
<input type="checkbox"/> HPV- hoog risico type (eSwab)	
<input type="checkbox"/> HSV 1/2 PCR (eSwab)	
<input type="checkbox"/> Mpox apenpokken (eSwab)	
<input type="checkbox"/> Overig: _____	
GASTROINTESTINAAL	
<input type="checkbox"/> Acute diarree	
<input type="checkbox"/> Feces PCR (SSCY, kweek indien PCR positief)	
<input type="checkbox"/> EHEC/ STEC PCR	
<input type="checkbox"/> Klachten > 10 dagen	
<input type="checkbox"/> Parasieten PCR	
<input type="checkbox"/> Parasieten PCR beperkt	
<input type="checkbox"/> Wormelieren (microscopie)	
<input type="checkbox"/> TFT (speciale afnameset, alleen in overleg)	
<input type="checkbox"/> Plakbandpreparaat (doorzichtig plakband gebruiken)	
<input type="checkbox"/> Clostridium difficile toxine PCR	
<input type="checkbox"/> Helicobacter pylori antigeen	
<input type="checkbox"/> Virale verwekkers gastro-enteritis PCR (noro-, rota-, adeno-, sapo-, astrovirus)	
<input type="checkbox"/> Overig: _____	
RESPIRATOIR	
<input type="checkbox"/> Banale kweek	
<input type="checkbox"/> Tuberculose (kweek incl. ZN)	
<input type="checkbox"/> Gisten/schimmels kweek	
<input type="checkbox"/> Kinkhoest PCR	
<input type="checkbox"/> SARS-CoV-2 PCR (virustransport medium)	
<input type="checkbox"/> Influenza/ RSV PCR (virustransport medium)	
<input type="checkbox"/> Legionella/ Mycoplasma/ Psittacose PCR	
<input type="checkbox"/> Legionella antigeen (urine)	
<input type="checkbox"/> Pneumococcon antigeen (urine)	
Overig: _____	
MULTIRESISTENTE MICRO ORGANISMEN	
<input type="checkbox"/> MRSA PCR (kweek indien positief)	
<input type="checkbox"/> Neus <input type="checkbox"/> Keel <input type="checkbox"/> Perineum <input type="checkbox"/> Overig: [Geel veld]	
<input type="checkbox"/> BRMO kweek (bijzonder resistent micro organismen)	
<input type="checkbox"/> Rectum <input type="checkbox"/> Overig: _____	
<input type="checkbox"/> Overig: _____	

Versie mei 2023

Invullen sticker voor buisje

Per buisje wordt een sticker meegeleverd in de verpakking.
Vul deze sticker helemaal in en plak deze op de buis.



Naam: _____
Geboortedatum: ____/____/____
Afnamedatum: ____/____/20____

Transport

Doe de buisjes samen met het labformulier in 1 safetybag en sluit deze.



Leg de safetybag op de gebruikelijke verzamelplaats voor kweekmateriaal voor het lab. Meestal is hiervoor een koelkast beschikbaar op locatie.

Wachten op uitslag

De uitslag wordt binnen een week verwacht. Wanneer je na 1 week na inleveren nog geen bericht hebt ontvangen, kun je ervanuit gaan dat de MRSA niet gevonden is en je dus geen drager bent.

En wat bij een positieve uitslag

Wanneer een of meerdere kweken wel positief zijn, dan is de MRSA-bacterie dus wel gevonden. In dat geval wordt er zo snel mogelijk contact met je opgenomen om vervolgstappen te zetten.

Heb je een positieve MRSA-uitslag ontvangen dan draag je dus de MRSA-bacterie wel bij je en kun je deze bacterie dus verspreiden. Daarom moet je dan zo snel mogelijk in overleg met je leidinggevende de cliëntgebonden werkzaamheden staken. Je komt dan niet meer op de afdeling of groep en in ruimten waar collega's samen komen of samen werken.

De deskundige infectiepreventie zal verder beleid ten aanzien van werken afstemmen.

Een arts-microbioloog zal adviseren in de al dan niet in te zetten behandeling tegen dragerschap van MRSA (loopt via de deskundige infectiepreventie).